

全城起動



2019冠狀病毒病
疫苗接種計劃
COVID-19 Vaccination Programme

快打疫苗

安老院、殘疾人士院舍、護養院及長者中心
「2019冠狀病毒病疫苗接種」
資訊分享會

2021年7月

2019冠狀病毒病疫苗


為何要接種？

疫苗安全嗎？
疫苗有效嗎？


疫苗的迷思和
正解

2019冠狀病毒病全球 疫情持續肆虐

Figure 1. COVID-19 cases reported weekly by WHO Region, and global deaths, as of 11 July 2021**



出現多種變異病毒株





儘早作出準備

- 市民需做好個人衛生，儘早接種疫苗，建立群體免疫力



我們相信第五波、第六波

袁國勇：必爆第五波疫情 倡六



接種疫苗是**安全及有效**的預防方法

2019冠狀病毒病疫苗顧問專家委員進行了**嚴格的評估**

科學委員會審視新冠疫苗**科學數據**及作出建議

成立新冠疫苗接種的藥物安全監測系統，**密切監測**疫苗發展，以確保其安全性


- 全球已接種超過**30億劑**2019冠狀病毒病疫苗¹。當中超過**五億劑**²復必泰疫苗及**二千萬**²劑科興疫苗

保護個人




保護他人

- 減低將新冠病毒傳播給**家人、同事、朋友**
- **特別是易受感染和體弱者的機率** (安老院 / 殘疾人士院舍院友及員工)
- 傳播能力**更強**的新冠變異病毒，主要在**未接種**新冠疫苗的人群中**迅速傳播**³



高風險群組人士更加需要儘早接種疫苗

- 長者
- 患有慢性疾病的人士
- 醫護人員
- 院舍員工



長者是最高風險群組

- 根據美國疾病控制及預防中心⁴ 2021 年 6月公布的數據

年齡	死亡率 (與 18 至 29 歲人士比較)
18 至 29 歲人士	1 倍
65 至 74 歲人士	95 倍
75 至 84 歲人士	230 倍
85 歲或以上人士	610 倍

- 根據香港2021年的數據 (截至 2021 年 6月數據)

年齡	死亡百分比
30 至 59 歲人士	0.2 %
60 至 69 歲人士	1.4 %
70 至 79 歲人士	7.8 %
80 歲或以上人士	25.1 %

- 感染後患有**嚴重疾病的風險**亦隨年齡顯著增加，尤以60歲或以上的長者為高風險

專家建議所有曾接種流感疫苗的長者均可安全地接種新冠疫苗



新冠疫苗可保護於社區和院舍中的長者，降低他們患上2019冠狀病毒病重症或死亡的風險。


專家建議所有曾接種
流感疫苗的長者
均可安全地接種
新冠疫苗



即使有慢性疾病，只要病情穩定，便應儘早接種疫苗以作保護。



最虛弱的長者，則可能需仔細權衡相關的效益與風險。



接種疫苗後同時採取其他預防措施，包括保持社交距離、良好手部衛生，以及在公眾地方佩戴口罩，可提供最佳的保護。

接種新冠疫苗後的放寬措施

1. 探訪安排
2. 檢測要求
3. 檢疫安排
4. 社交距離
5. 旅遊出行

 接種疫苗增加生活便利 		
社交距離	 食肆堂食 (D區)	 8人一枱至 02:00 
	 酒吧/酒館 夜店/夜總會	 2人一枱至 02:00 
	 浴室	至 02:00 
	 派對房間/ 卡拉OK	 4人一房至 02:00 
	 婚禮	室內50人 室外100人 
	 周年股東大會	室內50人 室外100人 
	 宗教活動	室內容量50% 室外容量100% 
探訪	 院舍及療養院	恢復探訪 (可選擇快速抗原測試) 
檢疫	 確診個案 密切接觸者	檢疫期減至7天(不涉及變種病毒) 或14天(涉及變種病毒) (配合病毒檢測和抗體測試) 
	 極高/甚高風險 以外地區抵港	檢疫期減至7天至14天 (配合病毒檢測) 
	 強制檢測公告	視為已遵從 強制檢測公告的規定 
檢測	 高風險/高接觸群組 (如餐飲及表列處所、 檢疫酒店、 院舍員工等)	無需定期檢測 
	 跨境貨車司機	無需進行每日入境核酸採樣 (須持72小時陰性檢測證明) 

接種疫苗後副作用輕微

	復必泰疫苗副作用	可能影響患者比例
非常常見	<ul style="list-style-type: none"> • 注射部位：疼痛、腫脹 • 疲倦 • 頭痛 • 肌肉痛 • 寒顫 • 關節痛 • 腹瀉 • 發燒 <p>12至15歲之青少年出現上述部分副作用的機會可能會較成年人略多。</p>	>1/10
常見	<ul style="list-style-type: none"> • 注射部位發紅 • 噁心 • 嘔吐 	≤1/10

	科興疫苗副作用	可能影響患者比例
十分常見	<ul style="list-style-type: none"> • 接種部位疼痛 • 頭痛 • 疲乏 	≥10%
常見	<ul style="list-style-type: none"> • 注射部位腫脹、痕癢、紅斑、硬結 • 肌肉痛 • 噁心 • 腹瀉 • 關節痛 • 咳嗽 • 發冷 • 痕癢 • 食慾減退 • 流鼻水 • 喉嚨痛 • 鼻塞 • 腹痛 	1% -10%

疫苗的迷思和正解

- **接種復必泰疫苗後，死亡率超出平日數字？**
 - 根據海外衛生當局和世界衛生組織的資料和建議，體弱長者接種復必泰疫苗後，死亡率並無異常增加
- **新冠疫苗研發和測試迅速，所以不安全？**
 - 疫苗中的所有成分，以及疫苗本身，都經過全面核對和監測，以確保其安全性

患有慢性疾病的人士可以接種新冠疫苗嗎？

患有慢性疾病的人士因感染2019冠狀病毒病而出現嚴重疾病及死亡的**風險較高**。所以，除非有禁忌症，**應該鼓勵他們接種新冠疫苗以作保護**。

接種疫苗的慢性疾病人士應繼續藥物治療

例子

高血壓

糖尿病

如病情穩定
應接種疫苗

慢性肝病

自體免疫性
風濕疾病

癌症

康復者應接種疫苗

正接受治療者應與醫生商討最佳時間

免疫系統受抑壓患者

應接種疫苗

與醫生商討最佳時間

接受器官移植者

應接種疫苗

但不建議剛接受移植或正接受高劑量免疫抑制者接種

正服用抗凝血藥

可接種疫苗

加長時間按壓針口至少5分鐘

急性心肌梗塞
或急性中風

等待3至6個月接種

待病情穩定

宣傳及更多公眾資訊

- 2019冠狀病毒病疫苗接種計劃
 - 專題網站: www.covidvaccine.gov.hk
- 2019冠狀病毒病專題網站
 - 專題網站: www.coronavirus.gov.hk/eng/index.html
- 2019冠狀病毒病疫苗接種計劃
 - 專題網站: www.covidvaccine.gov.hk
- 衛生署衛生防護中心 YouTube 頻道
 - <https://www.youtube.com/c/ChpGovHkChannel>
- 疫苗接種計劃
 - 熱線電話: **3142 2366**



香港特別行政區政府



本地情況互動地圖 | 最新消息 | 新聞短片 | 病毒資訊 | 澄清 | 實用資訊 | 疫情概覽 | 健康資訊 | 資源中心 | 社區參與



英語會
Facebook 專頁

政府新聞處
Facebook 專頁

政府新聞處
YouTube 頻道

政府新聞處
網站

衛生防護中心
Facebook 專頁

衛生防護中心
YouTube 頻道

醫院管理局
Facebook 專頁

醫院管理局
YouTube 頻道

हिन्दी | नेपाली | اردو | বাংলা | Bahasa Indonesia | Tagalog | മലയാളം | বাংলা ভাষা | Tiếng Việt

EN | 簡 | 字體大小 | 輸入關鍵字



香港特別行政區政府

繁體 簡體 English

हिन्दी | नेपाली | اردو | বাংলা | Bahasa Indonesia | Tagalog | മലയാളം | বাংলা ভাষা | Tiếng Việt



疫苗接種計劃邁進：第 102 天
已接種劑次：2,637,524 劑

距離社區疫苗接種中心提供第一劑疫苗的最後日期尚餘：86 天

社區疫苗接種中心尚餘名額 -
(1) 復必泰疫苗：約 1,892,000 人
(2) 科興疫苗：約 516,000 人

(市民同時可透過參與計劃的一千多名私家醫生接種科興疫苗)



全城起動 快打疫苗



2019冠狀病毒病
疫苗接種計劃
COVID-19 Vaccination Programme

點只打針咁簡單



謝謝



2019冠狀病毒病疫苗接種計劃
專題網站